

MUĞLA YÖRESİ YABAN HAYVAN LİSTESİ

Dok. No:	Sys.SA.Pl.40
Yay. Tarihi:	15.08.2025
Rev. No:	
Rev. Tarihi:	
Kriter:	D3.4
Sayfa:	1 / 7

Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alan ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan bir bölgedir. Dağlık alanlar, ormanlar, sulak alanlar ve kıyı ekosistemleri sayesinde birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanter çalışmaları ve koruma projeleri, bu zenginliğin belgelenmesine ve korunmasına katkı sağlamaktadır.

MEMELİ TÜRLERİ

Caracal caracal (Karakulak)



Endemiklik durumu: Endemik değil
Tehlike Kategorisi: LC (Asgari Endişe Altında)

Karakulak, Muğla genelinde yayılış göstermekle birlikte en yoğun bulunduğu alanlar Datça, Marmaris ve Köyceğiz'dir. Yapılan çalışmalarda belirtilen alanlarda 140 bireylik bir popülasyon varlığı tespit edilmiştir. Marmaris Aksaz askeri alan içerisinde yoğunluk görülmekte ancak daha batıda yoğunluk azalmaktadır.

Lutra lutra (Su Samuru)



Endemiklik durumu: Endemik değil
Tehlike Kategorisi: NT (Tehdide Yakın)

Su samuru Muğla genelinde sulak alanlarda görülen önemli bir memeli türüdür ve izlenmesi gerekmektedir. Su samurunun en yoğun olduğu alanlar; Hisarönü ve Gökova Körfezine dökülen dereler, Fethiye Körfezine dökülen doğal kanal ve dereler, Köyceğiz Gölü havzası ve bu havzaya dökülen dereler, Aksaz Bölgesi havzası ve dereleri ve Eşen Çayı olarak gösterilebilir. Türün özellikle Hisarönü ve Gökova Körfezi çevresindeki sulak alanlarda izlenmesi ve takip edilmesi önem arz etmektedir. Çünkü bu alanlardaki popülasyonu insan etkisi altında olup tehlike altındadır.

Ursus arctos (Bozayı)



Endemiklik durumu: Endemik değil
Tehlike Kategorisi: LC (Asgari Endişe)

Bozayı özellikle Datça, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde yayılış göstermektedir. En yoğun bulunduğu alan ise Marmaris Karacasöğüt, Hisarönü meLSileridir. Tür en yoğun olduğu alanlarda yaklaşık 50 birey olarak tespit edilmiştir.

MUĞLA YÖRESİ YABAN HAYVAN LİSTESİ

Dok. No:	Sys.SA.Pl.40
Yay. Tarihi:	15.08.2025
Rev. No:	
Rev. Tarihi:	
Kriter:	D3.4
Sayfa:	2 / 7

Vormela peregusna (Alaca sansar)



Endemiklik durumu Endemik değil
Tehlike Kategorisi VU (Hassas)

Alaca Sansar (Vormela peregusna); Muğla İli Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında Muğla için ilk kayıt olmuştur. Tespit edilen bu Alaca sansar bireyi, Seydikemer ilçesi, Temel Mahallesi, Kınıclar MeLSii, (Girdev yaylası), ormanlık alanında 1200-1500 metre rakımlar arasında değişen bir yükseltide görülmüştür.

KUŞ TÜRLERİ


Aythya ferina (Elmabaş Patka)



Endemiklik durumu Endemik değil
Tehlike Kategorisi VU (Hassas)

Küresel ölçekte “hassas” (VU) IUCN kategorisinde olan ve toplam popülasyonu yaklaşık 1.950.000- 2.250.000 birey arasında olduğu düşünülen Elmabaş Patka, özellikle Türkiye’nin neredeyse bütün bölgelerinde görülmekle beraber türe genellikle sakin tatlı sularda rastlanılabilmektedir. Özellikle erkeklerde kıvılcı kahverengi tonlardaki kafası ve kırmızımsı gözleri ile diğer türlerden kolaylıkla ayrılabilen dalıcı bir ördektir. Çoğu sulak alan kuşu gibi en büyük tehdidi avcılar olup genellikle eti ve doldurulmak üzere avlandığı bilinmektedir. Aşırı avlanma sonucunda popülasyonu büyük bir hızla azalma trendindedir.

Branta ruficollis (Sibirya Kazı)



Endemiklik durumu Endemik değil
Tehlike Kategorisi VU (hassas)

Küresel ölçekte “hassas” (VU) IUCN kategorisinde olan ve toplam popülasyonu yaklaşık 44.000- 56.000 birey arasında olduğu düşünülen Sibirya Kazı, özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde görülmekle beraber türe genellikle sığ sulak alanlar ve tarlalarda rastlanılabilmektedir. Kırmızı, siyah ve beyaz renk tonlarında, diğer türlerden kolaylıkla ayrılabilen bir kazdır. Ördek gillerin neredeyse tamamında olduğu gibi en büyük tehdidi avcılar olup genellikle eti için ve doldurulmak

MUĞLA YÖRESİ YABAN HAYVAN LİSTESİ

Dok. No:	Sys.SA.Pl.40
Yay. Tarihi:	15.08.2025
Rev. No:	
Rev. Tarihi:	
Kriter:	D3.4
Sayfa:	3 / 7

	üzere avlandığı bilinmektedir. Popülasyonu azalma trendindedir.
Oxyura leucocephala (Dikkuyruk) 	Endemiklik durumu Endemik değil Tehlike Kategorisi EN (Tehlikede) Küresel ölçekte “hassas” (VU) IUCN kategorisinde olan ve toplam popülasyonu yaklaşık 44.000- 56.000 birey arasında olduğu düşünülen Sibirya Kazı, özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde görülmekle beraber türe genellikle sığ sulak alanlar ve tarlalarda rastlanılabilmektedir. Kırmızı, siyah ve beyaz renk tonlarında, diğer türlerden kolaylıkla ayrılabilen bir kazdır. Ördekğillerin neredeyse tamamında olduğu gibi en büyük tehdidi avcılar olup genellikle eti için ve doldurulmak üzere avlandığı bilinmektedir. Popülasyonu azalma trendindedir.
Pelecanus crispus (Tepeli Pelikan) 	Endemiklik durumu – Tehlike Kategorisi CR (Kritik tehlikede) Küresel ölçekte “tehdide yakın” (NT) IUCN kategorisinde olan ve toplam popülasyonu yaklaşık 11.400 - 13.400 birey arasında olduğu düşünülen Tepeli Pelikan, özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde görülmekle beraber türe genellikle sakin tatlı sularda, dalyanlarda, baraj gölleri ve denizel koylarda rastlanılabilmektedir. Türkiye’deki diğer pelikanlardan daha büyük olması ve özellikle kafası üzerindeki kıvrık ve kabarık tüyleri ile kolaylıkla ayrılabilen bir pelikandır. Popülasyonu azalma trendindedir.
Streptopelia turtur (Üveyik) 	Endemiklik durumu Endemik değil Tehlike Kategorisi VU (Hassas) Küresel ölçekte “hassas” (VU) IUCN kategorisinde olan ve toplam popülasyonu yaklaşık 13.000.000 - 48.000.000 birey arasında olduğu düşünülen Üveyik, Türkiye’nin neredeyse bütün bölgelerinde, genellikle tarım alanları çevreleri ve ormanlık arazilerde görülebilir. Kumruya benzer, sırtı ve kanatlarının üzerindeki deseni ve sesi ile diğer kumrulardan kolaylıkla ayrılabilen bir kuştur. Doğada en büyük tehdidi avcılar olup

MUĞLA YÖRESİ YABAN HAYVAN LİSTESİ

Dok. No:	Sys.SA.Pl.40
Yay. Tarihi:	15.08.2025
Rev. No:	
Rev. Tarihi:	
Kriter:	D3.4
Sayfa:	4 / 7

	genellikle eti için avlandığı bilinmektedir. Aşırı avlanma sonucunda popülasyonu büyük bir hızla azalma trendindedir.
İÇ SU BALIK TÜRLERİ	
Coptodon zillii (Tilapya) 	Endemiklik durumu Endemik değil Tehlike Kategorisi NE (Belirlenmedi) Muğla ilinde Köyceğiz gölü ve bağlantılı nehir ağzlarında yayılım gösteren bu tür diğer balık türlerinin bölgede yayılım göstermesini baskılamaktadır. Türün bu bölgede popülasyon büyüklüğü her geçen gün artmaktadır. Bu bölgede egzotik tür olan ve göle sonradan aşılarmış olan Tilapya' (Coptodon zillii) nın aşırı çoğalması hem gölde yaşayan ye
Ladigesocypris irideus (İlik Balığı) 	Endemiklik durumu Endemik Tehlike Kategorisi NT (Neredeyse Tehdit Altında) IUCN (Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi) kriterlerine göre NT (Neredeyse Tehdit Altında) olarak kodlanan bu türün morfolojik özellikleri; vücut hafifçe yanal taraftan sıkıştırılmıştır. Vücudunu kaplayan düzenli ve vücuduna göre büyük sayılabilecek pullarla kaplanmışır. Vücut yüksekliği 1/3.4-1/4.1 standart uzunluktadır. Gözler büyük, tepe kısmı uca kadar eğik. Sırt kısmı gümüş-koyu ve ventral gümüş-parlak renklerde yanal boyunca morumsu bir şerit halinde devam eder. Sırt ve kuyruk kısmında koyu noktalar mevcuttur. Dişiler 10,5 erkek bireyler ise 7,3 cm uzunluğa kadar gelebilmektedir.
Salmo trutta macrostigma (Alabalık) 	Endemiklik durumu Endemik değil Tehlike Kategorisi DD Muğla'da sadece Ören-Seki arasında ki Eşen çayının dağlık ve yüksek debili bölgelerinde yaşayan bir türdür. Bu türün son yıllarda popülasyonunun iyice azaldığı hem bu proje kapsamında yapılmış olan arazi gözlemlerinde hem de yerel kaynaklardan edinilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Tür, Ören-Seki

MUĞLA YÖRESİ YABAN HAYVAN LİSTESİ

Dok. No:	Sys.SA.Pl.40
Yay. Tarihi:	15.08.2025
Rev. No:	
Rev. Tarihi:	
Kriter:	D3.4
Sayfa:	5 / 7

	arasındaki yaklaşık 15-20 km lik çok derin kayalık kanyon bölgesinde yaşamaktadır.
SÜRÜNGEN TÜRLERİ	
Trionyx triunguis (Nil Kaplumbağası) 	Endemiklik durumu Endemik değil Tehlike Kategorisi CR (Kritik Tehlikede) Ülkemizde Bulunan dört tür tatlı su kaplumbağasından birisi olan T. tringuinis, ana yaşam yeri Nil Nehri olduğu için bu isimi almıştır. IUCN kırmızı listesinde CR (Kritik tehlikede) kategorisinde yer alan bu türün yaşam alanı olarak bilinen bir noktası da Dalyandır. Trionyx triunguis büyük, koyu renkli ve yumuşak kabuklu üstten bastırılmış görünümündedir.
Lyciasalamandra fazilae subs. fazilae (Göcek Kara Semenderi) 	Endemiklik durumu Lokal Endemik Tehlike Kategorisi EN (Tehlikede) Lokal endemik bir tür olan Göcek kara semenderi ülkemizde sadece Gökçeovacı, Dalyan ve Üzümlü (Muğla) ile Tersane ve Domuz Adalarından oluşan çok dar bir alanda yayılım göstermektedir. Yaklaşık olarak 14 cm uzunluğunda, vücutları nispeten kalın ve kuyruğun enine kesiti yuvarlaktır. Sırt tarafının rengi pembemsi-kırmızımsı ve üzerinde kahverengi-siyah lekeler bulunur. Baş ve gövdenin uzunluğu kuyruk uzunluğuna eşit ya da biraz fazladır. Erkeklerin kuyruk kaidesinin üst kısmında hedonik çıkıntı adı verilen bir çıkıntı bulunur. Bu semender vücut rengi ve desenleri ile diğer tüm kara semenderlerinden farklıdır. Baş ve gövdenin üst kısmı turuncu kırmızısıdır. Bu zemin rengi üzerinde fazla ya
Lyciasalamandra fazilae subs. ulfetae (Göcek Kara Semenderi)	Endemiklik durumu Lokal Endemik Tehlike Kategorisi EN (Tehlikede) Göçmen ve ark., 2018, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman civarından toplanan Lyciasalamandra fazilae örnekleri moleküler açıdan değerlendirilerek “ulfetae” isminde yeni bir alttür tanımlanmıştır.

MUĞLA YÖRESİ YABAN HAYVAN LİSTESİ

Dok. No:	Sys.SA.Pl.40
Yay. Tarihi:	15.08.2025
Rev. No:	
Rev. Tarihi:	
Kriter:	D3.4
Sayfa:	6 / 7



Lychiasalamandra flavimembris subs. flavimembris (Marmaris Kara Semenderi)



Endemiklik durumu Lokal Endemik
Tehlike Kategorisi EN (Tehlikede)

Muğla ilinde, Ula ilçesi, Çiçekli civarında bulunmaktadır. IUCN Kırmızı Liste kriterlerine göre “EN” “Tehlikede” kategorisinde olan Lychiasalamandra flavimembris türünün “Dar Yayılışlı Endemik” olması, yangınlara karşı çok duyarlı olması nedeniyle aynı zamanda “Süreç Sınırlı Tür” olması nedeniyle önem arz etmektedir.

Lychiasalamandra flavimembris subs. ilgazi (Marmaris Kara Semenderi)



Endemiklik durumu Lokal Endemik
Tehlike Kategorisi EN (Tehlikede)

2015 yılında yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Lychiasalamandra flavimembris türüne ait yeni bir alttür olan Lychiasalamandra fazilae subs. ilgazi tanımlamıştır. Muğla ilinde Yeniköy ve Ortaköy güneyinde bulunmaktadır.

Lychiasalamandra luschani subs. luschani (Likya Kara Semenderi)

Endemiklik durumu Lokal Endemik
Tehlike Kategorisi VU (Hassas)

MUĞLA YÖRESİ YABAN HAYVAN LİSTESİ

Dok. No:	Sys.SA.Pl.40
Yay. Tarihi:	15.08.2025
Rev. No:	
Rev. Tarihi:	
Kriter:	D3.4
Sayfa:	7 / 7



IUCN Kırmızı Liste kriterlerine göre “VU” “Hassas” kategorisinde olan Lyciasalamandra luschani (Steindachner, 1891) Muğla İlinin Seydikemer İlçesine bağlı Dodurga Mahallesinde kayıt altına alınmıştır.

**Lyciasalamandra luschani subs. basoglui
(Likya Kara Semenderi)**



Endemiklik durumu Lokal Endemik
Tehlike Kategorisi VU (Hassas)

IUCN Kırmızı Liste kriterlerine göre “VU” “Hassas” kategorisinde olan Lyciasalamandra luschani basoglui alttürünün Muğla ili, Seydikemer İlçesinde Saklıkent civarında tespit edilmiştir.

Kaynak: T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü “Muğla İl Şube Müdürlüğü Muğla İli’nin Karasal Ve İçsu Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi İzlenecek Türler Ve Özellikli Alanlar” (2022)

Adı Soyadı

İBRAHİM MÜJDAT GÖLGELİ